

PROGRAM AZOTANOWY

TAB. 12. ZASOBY AZOTU MINERALNEGO WIOSNĄ W WARSTWIE GLEBY 0-60 CM (kg/ha N)*

Kategoria agronomiczna gleby	bardzo lekka	lekka	średnia	ciężka
Azot (kg/ha)	49	59	62	66

* Do obliczeń podane w tabeli wartości można zastąpić wynikami badania wiosną N_{min} dla działki rolnej i zastosować sposób obliczania podany w metodyce stacji chemiczno-rolniczej.

TAB. 13. ILOŚĆ AZOTU DZIAŁAJĄCEGO POZOSTAJĄCEGO PO UPRAWIE ROŚLIN BOBOWATYCH

Rodzaj przedplonu	Bobowate w czystym siewie		Bobowate w mieszankach z trawami lub zbożami		Przyorane liście roślin korzeniowych
	plon główny	międzyplon	plon główny	międzyplon	
Przyorane resztki poźniwne	30 kg	15 kg	20 kg	10 kg	25 kg
Przyorane całe rośliny na zielony nawóz	Łubin żółty – 74 kg Groch – 77 kg Seradela – 65 kg Pozostałe – 60 kg	Koniczyna czerwona – 30 kg Koniczyna biała – 27 kg Seradela – 33 kg Pozostałe – 30 kg	50 kg	20 kg	–